

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES y ADVERTENCIA DE USO y APLICACIÓN:

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado, cerrado, bajo sombra y buena ventilación, máximo por 7 días. Se recomienda mantener el producto bajo sombra (temperatura menor a 28° C), en un ambiente limpio y con buena aireación
- No almacene o transporte entre productos alimenticios, ropa, bebidas ni medicamentos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con agua y jabón

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de presentarse alguna anomalía durante el uso de producto llamar a un médico, o llevar al paciente a un Centro hospitalario, muestre la etiqueta. En caso tenga contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS: Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

- No contamina el ambiente
- No es tóxico en humanos, animales y plantas.
- Puede usarse en agricultura orgánica y convencional.

AT-SOL

BACTERIA ANTAGONISTA DE USO AGRICOLA

SOLUCION CONCENTRADA

Composición:

Bacillus amyloliquefaciens ≥ 1 x 10⁹ ufc/ml

PRODUCIDO Y DISTRIBUIDO



SOLUCIONES AGROSOSTENIBLES S.A.C

Av. Metropolitana Mz F1 Lote 5, Urb. San Isidro. Trujillo – Perú. gestioncomercial@solagro.com.pe / www.solagro.com.pe
 RPC: 943776031/994146899/958966012

Nº de Lote:
 F. de Form.:
 F. de Venc.:

CONTENIDO NETO : Litro

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GENERALIDADES: **AT-SOL**, ejerce control sobre hongos Fitopatógenos: *Sclerotium rolfsii*, *Mildiu*, *Oidium* sp., *Botrytis* sp., *Antracnosis*, *Colletotrichum* sp., *Alternaria* sp., *Phytophthora* sp., *Rhizoctonia* sp. En hojas, preventivo; actúa como protector de la filopiana compitiendo con los patógenos que se encuentran en campos infestados reduciendo el riesgo de infestación. En raíz, preventivo; actúa como protector del sistema radicular compitiendo con los patógenos que atacan las nuevas raíces jóvenes y en consecuencia reducen el riesgo de infestación.

SISTEMAS DE PREPARACION Y APLICACIÓN: Vaciar todo el contenido de AT-SOL en una depósito con agua, agitar de manera homogénea y finalmente agregar un adherente agrícola.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cuadro de uso:

Cultivo	Enfermedad		Dosis	PC	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico		(Días)	(ppm)
ARANDANO	"mancha foliar"	<i>Alternaria</i> sp	1 a 2 L/ 200 L	N.A	N.A
	"podrición radicular"	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	2 a 4 L/ Ha	N.A	N.A

PC: Periodo de Carencia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm) N.A.: No Aplica


FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: La aplicación debe realizarse en horas de la tarde, con baja radiación solar, y usando un surfactante agrícola para mejor adherencia sobre la hoja. Aplicar 3 a 4 veces con una frecuencia de 5 a 7 días.

PERIODO DE REINGRESO: Reingresar después de 2 horas de haber aplicado AT-SOL.

COMPATIBILIDAD: AT-SOL, no deberá mezclarse con Fungicidas, Bactericidas, productos cúpricos, alcalinos o que alteren la viabilidad del producto.

FITOTOXICIDAD: AT-SOL, no provoca fitotoxicidad en plantas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: EL Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PRECAUCION

