

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

GENERALIDADES: *Trichogramma sp.*, es una pequeña avispa que parasita huevos de aproximadamente 250 especies de lepidópteros. El ciclo biológico de este parasitoide es corto y generalmente es completado en 8 días. A las 24 horas de parasitado el huevo del insecto plaga (hospedero de *Trichogramma*) emerge una larva pequeña que puede durar 5 días para convertirse en pupa que alcanza su estado adulto a los 2 días (emergencia del adulto de *Trichogramma sp.*). Las liberaciones de este parasitoide son parte del Control Biológico que conforman el MIP.

CICLO DE *Trichogramma sp.*:



ALMACENAMIENTO: Mantener el producto bajo sombra, en un lugar fresco lejos de Insecticidas Químicos. No apilar las cajas.

MEDIDAS Y DISPOSICION DE ENVASES VACIOS: Luego de liberar *Trichogramma sp.* (según fecha de liberación) y verificar que el envase de plástico este totalmente vacío, puede reciclar el mismo, para uso en almacén. Después haber transcurrido entre 6 a 7 días, debe retirar las bolsistas de papel Kraft del campo de cultivo, y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Trichogramma sp

MICROAVISPA PARASITOIDE

PRESENTACION:

Trichogramma sp. 2 pulg²/bolsita de papel Kraft

DISTRIBUIDO POR:



SOLUCIONES AGROSOSTENIBLES S.A.C

Av. Metropolitana Mz F1 Lote 5, Urb. San Isidro.

Trujillo – Perú. gestioncomercial@solagro.com.pe / www.solagro.com.pe

Tel.: 044-611346 RPC: 943776031/958966012

PRODUCIDO POR:

BIOINSUMOS AGRICOLAS S.A.C

Via de Evitamiento 582.3 Km – Concejo Menor El Milagro .

Huancho – Trujillo - La Libertad

INSTRUCCIONES DE USO :

CULTIVO	PLAGA	PARASITOIDE	DOSIS	RECOMENDACIÓN
CAÑA	<i>Diatraea saccharalis</i>	<i>Trichogramma exiguum</i>	50 a 100 pul ² / Ha	Iniciar a liberar a partir del 2º o 3º mes hasta el 6º mes, previa evaluación del campo, integrar el control biológico con el uso de <i>Paratethra claripalis</i>
MAIZ	<i>Diatraea saccharalis</i>	<i>Trichogramma exiguum</i>	50 a 100 pul ² / Ha	Después de terminar las aplicaciones de productos químicos, iniciar con <i>T. exiguum</i> , tres liberaciones cada 7 días para cortar el ciclo de la plaga, a la dosis indicada.
PALTO	<i>Argyrotaenia sphaleropa</i>	<i>Trichogramma exiguum</i>	50 a 100 pul ² / Ha	Liberar en época de brotamiento, prefloración y floración, con presencia de posturas de la plaga.
ARANDANO	<i>Heliothis virescens</i>	<i>Trichogramma pretiosum</i>	100 a 200 pul ² / Ha	Liberar en época de brotamiento, prefloración y floración. Realizar tres liberaciones de <i>T. exiguum</i> a <i>T. pretiosum</i> , cada 7 o 10 días para cortar el ciclo de la plaga, a la dosis indicada.
ALGODÓN	<i>Heliothis virescens</i>	<i>Trichogramma pretiosum</i>	100 a 200 pul ² / Ha	Liberar en época de brotamiento, prefloración y floración.
ALFALFA	<i>Epinotia aporema</i>	<i>Trichogramma pretiosum</i>	50 a 100 pul ² / Ha	Liberar en época de brotamiento, prefloración y floración. Realizar tres liberaciones de <i>T. pretiosum</i> , cada 7 o 10 días para cortar el ciclo de la plaga, a la dosis indicada.

NOTA: SI EL CAMPO DE CULTIVO HA RECIBIDO APLICACIÓN DE QUÍMICOS CONSIDERAR LIBERAR ESTE PARASITOIDE DESPUES DE 7 A 10 DÍAS DE LA APLICACIÓN.

ESPECIE:.....

CONTENIDO pulg²

FECHA DE PARASITACION:

FECHA DE LIBERACION

(fecha de emergencia de microavispa):.....

LOTE Nº:

¡Recuerde!

LIBERACION: Realizar las liberaciones en tempranas horas de la mañana, en la fecha indicada. Con un 70% a 80 % de emergencia de adultos de *Trichogramma sp.*